

## PREPARAZIONI PER ESAMI RADIAGNOSTICI

### ECOGRAFIE

1. FEGATO
2. PANCREAS
3. MILZA
4. RENI
5. ADDOME SUPERIORE

PRESENTARSI A DIGIUNO

1. VESCICA
2. PROSTATA
3. UTERO
4. ANNESSI
5. PELVI
6. ADDOME INFERIORE
7. GINECOLOGIA

PRESENTARSI A VESCICA  
PIENA

1. ADDOME COMPLETO

PRESENTARSI A DIGIUNO E  
CON VESCICA PIENA

### RADIOLOGIA TRADIZIONALE CON CONTRASTO

1. RX ESOFAGO CON DOPPIO CONTRASTO (87.62.2)

PRESENTARSI A DIGIUNO  
DA 12 ORE PRIMA  
DELL'ESAME

2. RX ESOFAGO O STOMACO CON CONTRASTO

PRESENTARSI A DIGIUNO  
LA MATTINA PRIMA  
DELL'ESAME



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO  
[www.aslavellino.it](http://www.aslavellino.it)  
DIPARTIMENTO DI RADIODIAGNOSTICA  
Direttore dott. Lanfranco Musto

## **RISONANZA MAGNETICA CON E SENZA CONTRASTO**

*CONTROINDICAZIONI (vedi allegato)*

### **RISONANZA MAGNETICA CON CONTRASTO**

#### 1. ESAMI DA SEGUIRE

- a. Azotemia
- b. Creatinina

#### 2. PRESENTARSI A DIGIUNO

#### 3. PER I PAZIENTI CON ANAMNESI ALLERGICA

- Praticare 3 giorni prima dell'esame:
  - ✓ **Ranidil 300 mg** 1 capsula al giorno
  - ✓ **Telfast 120 mg** 1 capsula al giorno ( il farmaco può portare sonnolenza)
  - ✓ **BENTELAN FIALE 1,5 mg/2ml**, nei tre giorni precedenti la data dell'esame
  - ✓ **Visita anestesiologicala**



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO  
[www.aslavellino.it](http://www.aslavellino.it)  
DIPARTIMENTO DI RADIODIAGNOSTICA  
Direttore dott. Lanfranco Musto

ALLEGATO 4

## **RISONANZA MAGNETICA**

### **Controindicazioni Assolute e Condizioni Particolari**

#### **Controindicazioni assolute\***

- Clip vascolari ferromagnetiche;
- Pacemaker cardiaco;
- Dispositivi elettromeccanici non rimovibili;
- Alcuni impianti cocleari e protesi stapediale;
- protesi del cristallino con anse e punti intraoculari ferromagnetici (rare);
- catetere di Swan-Ganz;
- corpi estranei ferromagnetici contigui a vasi, occhi ecc.

*\*L'esame non deve essere eseguito !!*

#### **Controindicazioni relative\***

- Gravidanza (in particolare, nel primo trimestre).

*\*Esame eseguibile sotto responsabilità congiunta medico/paziente, qualora non "sostituibile" con altra indagine.*

#### **Controindicazioni particolari\***

- Corpi estranei ferromagnetici in sedi vitali;
- Clip o altri dispositivi metallici non ferromagnetici;
- filtri, stent e spirali di qualsiasi tipo, dopo sei settimane dall'impianto;
- vecchi tipi di shunt ventricolo-peritoneali;

*\*Previa adeguata informativa ed accettazione da parte del paziente.*



## **ESAMI CON CONTRASTO**

In ottemperanza ai principi di giustificazione ed ottimizzazione delle indagini radiologiche è necessario che il medico prescrittore ( il clinico ) fornisca tutte le informazioni disponibili sullo stato di salute del paziente attraverso la compilazione del seguente questionario che il paziente consegnerà al medico radiologo il giorno della esecuzione dell' esame.

Cognome e Nome.....  
Età.....  
Esame Richiesto .....  
Quesito Clinico.....

Disposizioni morbose che richiedono una differente tecnica di esame ed una attenta osservazione da parte del medico esecutore (radiologo )

Anamnesi allergica	SI	NO
Insufficienza epatica grave	SI	NO
Insufficienza renale grave	SI	NO
Sofferenza grave del miocardio	SI	NO
Insufficienza cardiocircolatoria grave	SI	NO
Mieloma Multiplo	SI	NO
Tireotossicosi	SI	NO

Firma del medico richiedente

.....

*In caso di positività alla anamnesi allergica il paziente eseguirà terapia desensibilizzante nei tre giorni che precedono l'indagine.*

*In caso di positività alle altre manifestazioni morbose il paziente eseguirà su giudizio del medico curante indagini di laboratorio specifiche da presentare all'atto dell'indagine.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO  
[www.aslavellino.it](http://www.aslavellino.it)  
DIPARTIMENTO DI RADIODIAGNOSTICA  
Direttore dott. Lanfranco Musto

## **TAC CON CONTRASTO**

### **Esami da eseguire**

1. Azotemia
2. Creatinina
3. Q.P.E. – quadro proteico
4. E.C.G.. (refertato)
5. Allegato 5 firmato dal proprio medico curante
6. Presentarsi a digiuno

### **Solo per i pazienti affetti da qualsiasi forma allergica**

*Praticare 3 giorni prima dell'esame:*

1. Zirtec 10 mg 1 capsula la sera
2. **BENTELAN FIALE 1,5 mg/2ml**, nei tre giorni precedenti la data dell'esame
3. Ranidil 300 mg 1 capsula al giorno per tre giorni
4. Visita anestesiologicala

## **Esami UROGRAFICI e RX Isterosalpingografia (87.83)**

### **Esami da eseguire**

1. Azotemia
2. Creatinina
3. Q.P.E.
4. E.C.G. (refertato)
5. Allegato 5 firmato dal proprio medico curante
6. Presentarsi a digiuno

### **Solo per i pazienti affetti da qualsiasi forma allergica**

*Praticare 5 giorni prima dell'esame la sera*

1. Zirtec 10 mg 1 capsula la sera
2. **BENTELAN FIALE 1,5 mg/2ml**, nei tre giorni precedenti la data dell'esame
3. Ranidil 300 mg 1 capsula al giorno per tre giorni
4. Visita anestesiologicala

### **Pulizia intestinale**

Per la preparazione all'esame utilizzare **SELG-ESSE** (4 buste) in farmacia.

Un intestino ben pulito facilita l'esame per l'esecuzione e per il paziente e rende l'esame stesso sicuramente più accurato

Si raccomanda al paziente di seguire di seguire scrupolosamente le istruzioni che seguono:

#### **Materiale**

Una confezione del prodotto da 4 buste serve per la preparazione di 4 litri di soluzione

#### **Preparazione**

Versare la polvere di ciascuna busta in un recipiente e sciogliere in un litro di acqua fredda (meglio se tiepida), agitando fino a che la polvere sia ben disciolta; preparare un litro alla volta; l'accettabilità migliora raffreddando la soluzione senza aggiungere ghiaccio.

#### **Modalità di somministrazione**

Iniziare la preparazione nel tardo pomeriggio precedente l'esame.

Evitare di ingerire cibi solidi da tre o quattro ore prima dell'inizio della preparazione e mantenere il completo digiuno dall'inizio della preparazione fino a dopo l'esecuzione del test. Bere ogni 15 minuti un quarto del prodotto fino ad un massimo di 4 litri.

Ogni porzione sarà bevuta rapidamente, evitando i piccoli sorsi e riposando per 10 minuti.

L'assunzione del preparato può tuttavia essere sospesa prima, solo nel caso in cui l'evacuazione è costituita da acqua totalmente limpida.

La somministrazione del prodotto darà luogo ad una diarrea importante priva di sintomi dolorosi, che inizia normalmente dopo un'ora e 30 circa dall'inizio della somministrazione.